

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 37
du 20 juillet 1984.

Evitez de traiter aux
heures chaudes de la
journée

Un traitement est efficace
s'il atteint les grappes.
Réglez vos appareils.

VIGNE

* MILDIOU : la situation s'assainit

Le temps chaud et sec favorise le dessèchement des taches de **Mildiou** et la situation s'assainit progressivement sur la majeure partie de la PLAINE ORIENTALE. Si ce temps persiste, la protection anti-Mildiou pourra donc se relâcher, sauf sur les vignes situées en bordure de la mer ou le long des rivières où l'humidité nocturne, très élevée, favorise les repiquages.

* OIDIUM : attention au Carignan

Des taches d'**Oidium** sur grains sont visibles, essentiellement sur Carignan. Maintenez la protection.

* TORDEUSES de la GRAPPE : 2ème vol très étalé

Des dépôts de ponte ont encore été observés à BRAVONE, PIANICCIA, ALERIA. Ce vol est étalé; en conséquence :

- sur PORTO-VECCHIO, région de CALVI, ORTOLO, RIZZANESE, TARAVO : inutile d'intervenir.
- sur SAINT-FLORENT et PATRIMONIO, le traitement aérien contre les Cicadelles rend inutile toute intervention contre les vers de la grappe.
- dans le CAP, MARANA, CASINCA, et NORD de la PLAINE ORIENTALE, ainsi que les COTEAUX D'AJACCIO, prévoyez une intervention sur les cépages sensibles à la pourriture grise, dès les 23 - 24 juillet.
- sur AGHIONE, PIANICCIA, ALERIA, GHISONACCIA où une première intervention a dû être déjà réalisée, le vol est très étalé, mais faible dans l'ensemble. Les dépôts de ponte sont parfois nombreux, en particulier sur GHISONACCIA.

... / ...

P20

Vérifiez l'efficacité du traitement en observant les grappes 10 jours après ; si 10 % des grappes sont atteintes, vous pouvez effectuer un traitement curatif avec un produit contenant du Parathion.

*** CICADELLES de la FLAVESCENCE DOREE**

Une application de produit insecticide devra être réalisée dans toutes les zones atteintes, dans la semaine du 25 au 31 juillet.

*** ACARIENS JAUNES et ROUGES**

Des populations souvent élevées rendent nécessaire une intervention. Si le seuil de 50 % de feuilles occupées est atteint, vous pouvez traiter . (Voir plus loin la liste des produits).

A R B R E S F R U I T I E R S

*** ACARIENS**

Seuils d'intervention sur pommier et pêcher : 60 % de feuilles occupées avec :

<u>Matières actives</u>	<u>Produits commerciaux</u>	<u>Observations- utilisation</u>
Amitraze 60 g de ma/hl	MAITAC 20, TUDY	AF
Azocyclotin 30 g de ma/hl	PEROPAL	Pommier uniquement - V
Benzoximate 40 g de ma/hl	ARTABAN	AF - V
Bromopropylate 50 g ma/hl	NEORON	Action progressive AF-V
Chlorofenizon 30 g de ma/hl	OVITOX	Pommier uniquement - V
	TRICHLORFENSON	Non efficace sur adultes
Cyhexatin 30 g de ma/hl	MITACID PLICTRAN	[AF - V (seulement arai- gnée rouge)
	TECHNACID	AF - V Dose du fabricant
Cyhexatin + Tétradifon	ACARYL PL, DORVERT	V
Dicofol 50 g de ma/hl	Nombreuses spécialités	V Dose du fabricant
Dicofol + Diéthion	ACAFOR	AF - V Dose du fabricant
Dicofol + Tétradifon	KELTHION	Action progressive AF-V
Fenbutatin oxyde 50 g de ma/hl	TORQUE	[AF-V Déconseillé/pommier
Fenizon 50 g de ma/hl	OVICIDE SEPPIC	Golden. Non effc/adultes
	TRIFENSON	AF Déconseillé/pommier
Fenizon+Dicofol (Dose fabricant)	OXFOR	Pommier uniquement - V
Fenpropathrin (" ")	DANITOL	[AF - V Déconseillé sur
Propargite 80 g ma/hl	OMITE	poirier. Formulation li- quide déconseillée sur pommier Golden.

A F = Arbres fruitiers

V = Vigne

*** OIDIUM sur PECHER**

Maintenez la protection

O L I V I E R S

Premières captures enregistrées en MARANA et à ALERIA. Un premier traitement s'avère dès à présent nécessaire.